



SHUTOUT® - PRODUS DE ETANSARE MAMARĂ UN NOU STANDARD ÎN PREVENIREA MASTITEI

Compoziție: 4 grame de
suspensie intramamară **sterilă**, fără antibiotice,
conține 2,6 grame de subnitrat de bismut.

ShutOut® este un produs de etansare mamară fără antibiotice, care oferă o protecție suplimentară în timpul perioadei de repaus mamar, suplimentând dopul de keratină natural al vacii. Produsul a fost proiectat cu gândul la operativitatea dumneavoastră. Ușor de administrat, seringă ergonomică oferă două opțiuni de vârf, oferind flexibilitatea de a alege între inserarea vârfului scurt recomandat și inserarea vârfului lung. ShutOut este ușor de utilizat și este creat pentru a rămâne la locul său pentru o eficacitate maximă. O PARTE DE IMPORTANȚĂ VITALĂ A PROGRAMULUI DUMNEAVOASTRĂ DE MANAGEMENT AL VACILOR ÎN PERIOADA DE REPAUS MAMAR.

→ NOUL STANDARD DE ADMINISTRARE



Optimizat pentru administrare ușoară și rapidă

- **Capac** ușor de desfăcut
- **Cursă** scurtă a pistonului
- **Aer minim** în seringă
- Aplicare **confortabilă**
- **Timp mai** scurt de aplicare
- **Posibilitatea de** a utiliza un vârf scurt pentru o administrare mai rapidă și mai sigură



Seringă ergonomică, cu opțiune de vârf dublu

- **Utilizatorul poate** alege pentru administrare fie vârful scurt recomandat, fie vârful lung.
- **Utilizarea vârfului mai scurt reduce riscul** unor noi infecții intramamare, în special al introducerii unor agenți patogeni în uger, în timpul procedurii de întarcare a vacii, înainte de fătare.
- **Opțiunea cu vârf lung poate fi utilizată** pentru siguranța tratamentului, de exemplu pentru a preveni ieșirea vârfului din mamelon, atunci când vaca se mișcă sau este nervoasă.



Șervețele dezinfectante biodegradabile

- Se descompun **complet în decurs** de 6-12 săptămâni.
- **Noua tehnologie** protejează mediul.



Protecție dublă

- Atât ambalajul, cât și produsul sunt **sterilizate**.
- **Procesul oferă** o protecție suplimentară împotriva dezvoltării unor noi infecții ale glandei mamare în perioada de repaus mamar.





Produs fabricat de MSD Animal Health

- **Susținut de argumentele științifice**, asistență tehnică și servicii pentru clienți.
- **Garanția** că în fiecare tub se află un produs cu aceleași proprietăți în toate circumstanțele
- **Asigurarea** bunei producții și aprovizionarea produsului pe piață.



Ambalaj în două opțiuni

- **24 și 144** de seringi.
- **Potrivit** pentru fermele mari și mici.



ÎNCREDERE DATORITĂ UNEI APLICĂRI ÎMBUNĂTĂȚITE

→ SHUTOUT® - FĂRĂ ANTIBIOTICE, SUSPENSIE INTRAMAMARĂ

SHUTOUT 2.6 g / seringă - suspensie pentru administrare intramamară la vaci în perioada de repaus mamar

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizăției de comercializare:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxtmeer, Țările de Jos

Produsător responsabil pentru eliberarea seriei:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

85716 Unterschleißheim

Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ShutOut 2.6 g / seringă - suspensie pentru administrare intramamară la vaci în perioada de repaus mamar

Substrat de bismut

3. DECLARAREA (SUBSTANȚE) SUBSTANTELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Fiecare seringă intramamară de 4 g conține:

Substanța activă:

Substrat de bismut 2.6 g

(echivalent cu bismut 1.9g)

Suspensie omogenă de culoare albă până la ușor gălbui.

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Prevenirea infecțiilor intramamare noi în timpul perioadei de repaus mamar.

La vacile considerate a fi imune de mastită subclinică, produsul poate fi utilizat de unul singur în managementul vacilor aflate în perioada de repaus mamar și în controlul mastitelor.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează produsul singur la vacile cu mastite subclinice în perioada de repaus mamar.

Nu se utilizează produsul la vacile cu mastită clinică la momentul întărcării.

Nu se utilizează la vaci în lactație. Consultați secțiunea 12.

Nu se utilizează în cazuri cunoscute de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII TINTĂ

Vaci de lapte la intrarea în perioada de repaus mamar.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Nu mai utilizați produsul intramamar.

Infuzați conținutul unei singure seringi intramamare de ShutOut în fiecare sferă mamară, o singură dată, imediat după ultima mulsăre a perioadei de lactație (la începutul perioadei de repaus mamar).

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul are o duză cu vârf dublu. Capacul seringii poate fi parțial sau complet îndepărtat. Oferă astfel opțiunea de a utiliza seringă cu un vârf scurt pentru o tehnică de inserare parțială, astfel încât seringă trebuie introdusă doar în vârful mamelonului.

Se recomandă cupierea la baza tetinei, deoarece ajută la poziționarea pastei în rezervorul tetinei, etanșând canalul mamelonar de la varf.

Opțiunea de vârf scurt: Opțiunea de vârf scurt permite o tehnică de inserare parțială, astfel încât seringă trebuie introdusă doar în capătul mamelonului.

Opțiunea de vârf lung: Opțiunea de vârf lung poate fi utilizată pentru confortul tratamentului, de exemplu, pentru a preveni alunecarea vârfului din cauza mișcărilor vacii sau a unui animal nervos.

Pașul 1: Îndepărtarea capacului care se poate rupe



Pașul 2: Inserarea vârfului lung sau scurt



Se recomandă utilizarea vârfului scurt pentru a-l introduce parțial, reducând astfel probabilitatea unor infecții noi. Infuzați conținutul unei seringi de ShutOut în fiecare sferă de uger imediat după ultima mulsăre a perioadei de lactație (la începutul perioadei de repaus mamar). Nu masați mamelonul sau ugerul după ce ați infuzat produsul deoarece este important ca produsul să rămână în mamelon și să nu patrundă în uger.

Trăiește la precauții pentru a evita introducerea agenților patogeni în mamelon și a reduce astfel riscul apariției mastitelor post-infuzare. Este esențial ca mamelonul să fie bine curățat și dezinfectat, cu șervețele impregnate cu alcool ce însoțesc produsul. Mameloanele trebuie curățate până în momentul când șervețelele nu mai sunt vizibil murdare. Mameloanele trebuie lăstate să se usuce, înainte de infuzie. Infuzați produsul în condiții aseptice și aveți grijă să nu contaminați vârful seringii. După infuzare, se recomandă utilizarea unui agent de curățare corespunzător a mamelonului, prin imersie sau prin pulverizare.

În condiții de frig, produsul poate fi încălzit la temperatura camerei într-un mediu cald, pentru a ușura infuzarea.

10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 0 zile.

Lapte: 0 ore.



11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima zi din aceea luna.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru fiecare specie țintă:

Selecția vacilor pentru tratamentul cu acest produs trebuie să se bazeze pe investigația clinică efectuată de către medicul veterinar. Criteriul de selecție trebuie să se bazeze pe istoricul individual al vacilor în ceea ce privește mastitele și număratoarea celulară, pe testele recunoscute de detectare a mastitelor subclinice sau pe testarea bacteriologică.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Observarea vacilor în perioada de repaus mamar, în mod frecvent, este o practică bună pentru a evidenția semnele mastitei clinice. În cazul în care unul din sferturile mamare tratate cu produsul medicinal veterinar dezvoltă mastită clinică, sfertul respectiv afectat va trebui să fie golit manual înainte de a se instaura terapia necesară.

Pentru a reduce riscul contaminării nu introduceți seringă în apă.

Utilizați seringă o singură dată.

Este important să se respecte strict tehnica aseptică pentru administrarea ShutOut, deoarece produsul nu are activitate antimicrobiană.

Nu administrați orice alt produs intramamar, după administrarea de ShutOut. La vacile care pot avea mastită subclinică, ShutOut poate fi utilizat după administrarea unui tratament cu antibiotic adecvat pentru vaci în perioada de repaus mamar a sfertului infectat.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Acest produs poate cauza o iritație la nivelul pielii și ochilor.

Evitați contactul cu pielea sau ochii.

Dacă apare contactul cu pielea sau cu ochii, spălați bine zona afectată cu apă. Dacă iritația persistă, consultați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul.

Dacă știți că sunteți alergic la sărurile de bismut, evitați utilizarea acestui produs.

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Șervețele dezinfectante:

Șervețele dezinfectante pot provoca iritarea pielii și a ochilor din cauza prezenței alcoolului izopropilic. Evitați contactul cu ochii. Evitați contactul prelungit cu pielea. Evitați inhalarea vaporilor. Purtarea mănușilor poate preveni iritarea pielii. Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Perioada de gestație:

Deoarece produsul nu este absorbit după infuzia intramamară acesta poate fi utilizat la animalele gestante. După fătare, produsul poate fi ingerat de vițel. Ingestia de ShutOut de către vițel este sigură și nu produce efecte adverse.

Perioada de lactație:

Produsul este indicat pentru utilizare în perioada de repaus. Dacă este utilizat accidental la o vacă în lactație, se observă o ușoară creștere tranzitorie (de până la 2 ori) a celulelor somatice. Într-un astfel de caz se îndepărtează produsul manual, nu sunt necesare precauții suplimentare.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Studiile clinice au demonstrat compatibilitatea formulei de etanșare a mamelonului doar cu preparate ce conțin cloxacilină administrate la vaci în perioada de repaus mamar.

Supraînzorare (simptomatice, proceduri de urgență, antibiotice):

Nu au fost observate reacții adverse la vaci după administrarea unei doze duble față de doza recomandată.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Cuție cu 24 de seringi și șervețele dezinfectante alcoolice.

Găsește cu 144 de seringi și șervețele dezinfectante alcoolice.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi com.

BIBLIOGRAFIE:

1. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>

2. Williamson JH, et al. The prophylactic effect of a dry-cow antibiotic against Streptococcus uberis - Efectul profilactic al unui antibiotic administrat vacilor în perioada de suprimare a lactației înainte de fătare împotriva Streptococcus uberis. N Z Vet J. 1995;228.

3. Dingwell RT, et al. Management of the dry cow in control of peripartum disease and mastitis. - Managementul vacilor în perioada de suprimare a lactației înainte de fătare în controlul bolii peripartului și mastitei. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2003; 19:235-265.

4. Dingwell R, Leslie K, Sargeant J, Schukken Y, Timms L. Impact of milk production and important management factors on the process of dry-off in lactating dairy cows. Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports - Impactul producției de lapte și a factorilor importanți de gestionare asupra procesului de suprimare a lactației înainte de fătare la vacile de lapte care alăptează. Rapoarte de cercetare a stației de experiment agricol din Kansas, 2001.

5. Dingwell, R.T., Leslie, K.E., Schukken, Y.H., Sargeant, J.M., Timms, L.L., Duffield, T.F., Keefe, G.P., Kelton, D.F., Lissemore, K.D., Conklin, J. Association of Cow and Quarter Level factors at dry Off and New Intramammary Infections in the Dry Period. Prev Vet Med. 2004; 63(1-2):75-8.

6. Rabiee AR, Lean IJ. The effect of internal teat sealant products on intramammary infection, clinical mastitis, and somatic cell counts in lactating dairy cows - Efectul produselor de etanșare internă a mamelonului asupra infecției intramamare, mastitei clinice și numărului de celule somatice la vacile de lapte care alăptează. J Dairy Sci.2013;96:6915-6931.

7. Boddie RL, Nickerson SC. Dry cow therapy: Effects of method of drug administration on occurrence of intramammary infection - Terapia vacilor în perioada de suprimare a lactației înainte de fătare:

Efectele metodei de administrare a medicamentelor asupra apariției infecției intramamare. J Dairy Sci. 1986; Vol. 69, No. 1.

8. Shutout ® - Rezumatul caracteristicilor produsului

ÎNCREDERE DATORITĂ UNEI APLICĂRI ÎMBUNĂTĂȚITE